



## SCINTIGRAPHIE RENALE DYNAMIQUE AVEC TEST AU CAPTOPRIL

### Informations

- L'examen dure environ 3 heures, réparties entre l'injection du traceur et l'acquisition des images scintigraphiques.

### Déroulement

- **1<sup>ère</sup> Phase : 1<sup>ère</sup> Injection de radiotracer avec acquisition d'images** sur environ 45 minutes.
- **2<sup>ème</sup> Phase : prise orale du comprimé de Captopril**, surveillance par l'équipe médicale pendant 1 heure.
- **3<sup>ème</sup> Phase** Injection du traceur (Tc99m-DTPA ou MAG3) 1 heure après la prise du Captopril suivie d'images scintigraphiques sur environ 45 minutes.

### Précautions

- Pas de précaution particulière. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- L'arrêt du traitement par les IEC et les diurétiques est nécessaire, les consignes vous seront données lors de la prise du rendez-vous.
- Pour le bon déroulement de l'examen, il est important de boire tout au long de la journée.
- Apporter votre CARTE VITALE (ou Attestation d'assuré si vous n'êtes pas en possession de la Carte Vitale), et **tous les examens (radio, scanner, IRM) concernant la pathologie à examiner.**