



SCINTIGRAPHIE AU GALLIUM 67

L'examen se déroule sur deux jours (jour de l'injection et celui de l'acquisition des images scintigraphiques).

Cet examen est souvent couplé à la scintigraphie osseuse en 3 temps, dans le cadre de la recherche de foyers d'infection. Dans ce cas, la scintigraphie au Gallium doit être réalisée dans les 15 jours suivant la scintigraphie osseuse.

Déroulement :

1^{ère} Phase : Injection du traceur (Gallium).

2^{ème} Phase : Images tardives Acquisition des images scintigraphiques 2 jours après l'injection, de 8h15 à 9 heures. Durée de l'acquisition : environ 45 minutes, le plus souvent en décubitus dorsal.

Précautions

- Pas de précaution particulière. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun ni d'arrêter un traitement éventuel.
- Si vous êtes enceinte ou si vous avez un retard de règles, vous devrez le signaler au personnel médical **avant** l'injection.
- Pour le bon déroulement de l'examen, il est important de boire tout au long de la journée, afin de faciliter l'élimination du radiotraceur.
- Apporter votre CARTE VITALE (ou Attestation d'assuré si vous n'êtes pas en possession de la Carte Vitale), et tous les examens (radio, scanner, IRM, échographie, etc. ...) concernant la pathologie à explorer.